



1. Простатит

1. Острый период или обострение хронического простатита

- "Эй-пи-ви" - 1,5 месяца;
- "Апиток" - по 1/2 ч.л. 2 раза в день в первой половине дня - 1 месяц;
- "Тенториум плюс" - 1 месяц;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома").

2. Восстановительный или в период ремиссии

1-й этап - 1,5 месяца

- "Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды;
- "Тополёк" - 1,5 месяца;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" наносить на область крестца - по 2 недели (потом 2 недели перерыв) для улучшения микроциркуляции в предстательной железе.

2-й этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Молочко трутневое" - 1,5 месяца;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" (см. 1-й этап).

2. Аденома предстательной железы

1-й этап-1,5 месяца

- "Продукт №1" по нарастающей схеме, за 20 мин до еды;
- "Тополёк", "Экстра-Бэфунгин" - 1,5 месяца;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- "Апиток" - 1 месяц по 1/2 ч.л. утром;
- Смесь крема "Витус-Фактор" (3 части) с "Апибальзамом 1" - (1 часть) с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы) вводить в прямую кишку на ночь. Применять курсами по 10 дней с 2-недельными перерывами.

2-й этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
- "Полянка" - в первой половине дня - 1,5 месяца;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. 1-й этап). После завершения 2-го этапа - 1 месяц перерыв и повторять курс, начиная с 1-го этапа. Лечение аденомы длительное, на протяжении многих лет.

3. Импотенция (эректильная дисфункция)

1-й этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Хлебина" - 1,5 месяца;
- "Апифитотонус" - 1 месяц;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" (см. "Простатит").

2-й этап - 1,5 месяца

- "Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- "Полянка", "Молочко трутневое" - 1 месяц;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" (см. "Простатит").

3-й этап - 1,5 месяца

- "Зй-пи-ви", "Тополёк" - 1,5 месяца;
- "Формула Ра" - 1 месяц;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" (см. "Простатит").

4 й этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Тенториум плюс" - 1 месяц;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- "Алиток" - 1,5 месяца;
- Смесь крема "Витус-Фактор" с "Апибальзамом 1" (см. "Аденома");
- Крем "Тенториум" (см. "Простатит").